

Urząd Gminy Poświętne

<https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/969,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-3.html>
25.06.2024, 00:21

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-36

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
W WARSZAWIE

Oddział w Warszawie

R- 36

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

GŁOWNIA KUKURYDZY

W celu zabezpieczenia kukurydzy przed wystąpieniem gówni kukurydzy należy przed siewem zaprawić ziarno, jedną z niżej wymienionych zapraw:

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

<u>kg ziarna</u>		<u>Dawka na 100</u>
	SAROX T 500 FS	375 ml + 750 ml
H ₂ O		
	VITAVAX 200 FS	250-300 ml +
250-300 ml H ₂ O		
	ZAPRAWA OXAFUN T 75 DS/WS	250 g lub 250 g +
1000 ml H ₂ O		

Wymienione zaprawy zabezpieczają również przed zgorzelą siewek.

W celu zabezpieczenia kukurydzy zarówno przed gównią kukurydzy i ploniarkami zaleca się łączne stosowanie zapraw:

VITAVAX 200 FS (w dawce 0,3 l/100 kg nasion) + GAUCHO 350 FS (w dawce 1,1 l/100 kg nasion) +. Nasiona należy najpierw zaprawić fungicydem - Vitavax 200 SL (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania), a następnie insektycydem - Gaucho 350 FS.

Zalecane zaprawy zabezpieczają rośliny przed infekcją tylko w początkowym okresie wegetacji tj. w okresie siewek (około 6 tygodni). Ponieważ większość infekcji występuje zwykle w późniejszym okresie wegetacji roślin, w celu ochrony upraw kukurydzy przed głownią, zalecane jest stosowanie

następujących zasad:

- wysiewanie zdrowego materiału siewnego,
- usuwanie pierwszych, nielicznych guzów głowniowych (przed ich pękaniem),
- unikanie uprawy kukurydzy w monokulturze,
- zebranie porażonych organów roślin i usuwanie ich z plantacji oraz niszczenie ich przez spalenie lub głębokie zakopanie,
- na zainfekowanym polu nie uprawianie kukurydzy przez 4 lata,
- ograniczenie powstawania zranień roślin, ułatwiających wnikanie zarodników grzyba do tkanek roślin poprzez zwalczanie szkodników np. ploniarek, mszyc, omacnicy prosowianki
- po zbiorze kukurydzy słomę należy nisko skosić i pociąć na drobną sieczkę,
- rozdrobnione resztki poźniwne głęboko przyorać, aby pozostałe w glebie zarodniki grzybów nie mogły wiosną wydostać się na jej powierzchnię.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą - instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do

prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust.. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Gminy Poświętne

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Beata Górecka

Osoba udostępniająca informację:

Beata Górecka

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)